

PROTOCOLO

**MANEJO ANTIVIRAL
OSELTAMIVIR (TAMIFLU®)**



Nº 1

26/12/2021



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

PROTOCOLO

MANEJO ANTIVIRAL OSELTAMIVIR (TAMIFLU®)



Frente ao aumento no número de casos de influenza e no número de prescrições de antivirais nas últimas semanas de 2021, o Hospital São José vem, por meio deste, **reforçar as indicações da terapia e da profilaxia com o antiviral Osetamivir.**

A assertividade nas condutas, com base nas boas práticas, nas recomendações de documentos técnicos da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará e do Ministério da Saúde, garante o uso adequado e racional de antivirais.

As recomendações para tratamento e profilaxia encontram-se nas próximas páginas. Para maiores detalhes, consulte as Notas Técnicas:

- Nota informativa Influenza 16/12/2021. Sesa Ceará.
- Protocolo Tratamento Influenza. 2017. Ministério da Saúde.

Essa versão pode ser atualizada à luz de novas informações.

INDICAÇÕES DE TRATAMENTO COM OSELTAMIVIR PARA SÍNDROME GRIPAL



*SRAG – Síndrome Respiratória Aguda Grave

INDICAÇÕES DE PROFILAXIA COM OSELTAMIVIR



- A quimioprofilaxia da influenza é situação de exceção. **A quimioprofilaxia indiscriminada não é recomendável**, pois pode promover o aparecimento de resistência viral.
- Não está mais indicada se o período após a exposição já for **maior que 48 horas**.
- As indicações são:
 - Pessoas expostas a caso suspeito/confirmado de influenza com risco elevado de complicações, não vacinadas ou vacinadas contra a gripe há menos de duas semanas;
 - Crianças com menos de 9 anos com condições de risco expostas a caso suspeito/confirmado de influenza no intervalo entre a 1ª e 2ª dose ou com menos de 2 semanas após a 2ª dose da vacina contra a gripe;
 - Imunossuprimidos graves expostos a casos suspeitos/confirmados de influenza;
 - Profissionais de laboratório, não vacinados ou vacinados contra a gripe há menos de 15 dias, que tenham manipulado amostras que contenham o vírus influenza sem uso adequado de EPI;
 - Trabalhadores de saúde, não vacinados ou vacinados contra a gripe há menos de 15 dias, e que estiveram em procedimentos geradores de aerossóis ou na manipulação de secreções de caso suspeito/confirmado de influenza, sem o uso adequado de EPI;
 - Residentes (com comorbidades) em instituições fechadas e hospitais de longa permanência durante surtos.

DOSES DE OSELTAMIVIR PARA TRATAMENTO

FAIXA ETÁRIA		POSOLOGIA	DURAÇÃO
Adulto		75mg VO 12/12h	5 dias
Criança maior de 1 ano de idade	≤ 15kg	30mg VO 12/12h	
	> 15kg a 23 kg	45mg VO 12/12h	
	> 23kg a 40 kg	60mg VO 12/12h	
	> 40kg	75mg VO 12/12h	
Criança menor de 1 ano de idade	0 a 8 meses	3mg/kg VO 12/12h	
	9 a 11 meses	3,5mg/kg VO 12/12h	

DOSES DE OSELTAMIVIR PARA PROFILAXIA

FAIXA ETÁRIA		POSOLOGIA	DURAÇÃO
Adulto		75mg VO 1x/dia	10 dias
Criança maior de 1 ano de idade	≤ 15kg	30mg VO 1x/dia	
	> 15kg a 23 kg	45mg VO 1x/dia	
	> 23kg a 40 kg	60mg VO 1x/dia	
	> 40kg	75mg VO 1x/dia	
Criança menor de 1 ano de idade	0 a 8 meses	3mg/kg VO 1x/dia	
	9 a 11 meses	3,5mg/kg VO 1x/dia	

SEADE

SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À
SAÚDE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL



HOSPITAL
SÃO JOSÉ
DE DOENÇAS
INFECCIOSAS



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE