

Fortaleza, 27 de abril de 2018

Nota Informativa Nº 03/2018

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, por meio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, **ORIENTA** os farmacêuticos das Unidades de Saúde Públicas municipal e estadual, farmacêuticos dos hospitais da rede particular, médicos prescritores de instituições públicas, privadas e consultórios particulares sobre a dispensação de Oseltamivir na profilaxia da influenza 2018, que está diretamente vinculada ao PROTOCOLO DE TRATAMENTO DE INFLUENZA 2017.

QUIMIOPROFILAXIA NA INFLUENZA | ADVERTÊNCIA

A quimioprofilaxia indiscriminada **NÃO** é recomendável, pois pode promover o aparecimento de **RESISTÊNCIA VIRAL**.

A QUIMIOPROFILAXIA com antiviral **NÃO É RECOMENDADA** se o período depois da última exposição* a uma pessoa com infecção pelo vírus for após 48 horas.

*Considera-se exposição quando a pessoa teve contato com caso suspeito ou confirmado para influenza.

INDICAÇÕES PARA QUIMIOPROFILAXIA

A quimioprofilaxia é ideal e recomendável preferencialmente em casos em que os contatos estejam em ambientes **FECHADOS**, como hospitais de longa permanência, presídios, hospitais psiquiátricos, asilos, etc.

- Pessoas com **RISCO ELEVADO DE COMPLICAÇÕES**, não vacinadas ou vacinadas há menos de duas semanas, **APÓS EXPOSIÇÃO** a caso suspeito ou confirmado de influenza.
- **CRIANÇAS COM MENOS DE NOVE ANOS DE IDADE, PRIMOVACINADAS**, necessitam de segunda dose da vacina com intervalo de um mês para serem consideradas vacinadas. Aquelas com condições ou fatores de risco, que foram expostas a caso suspeito ou confirmadas no intervalo entre a primeira e a segunda dose, ou com menos de duas semanas após a segunda dose.
- **PESSOAS COM GRAVES DEFICIÊNCIAS IMUNOLÓGICAS** (exemplos: que usam medicamentos imunossupressores; afetadas por **AIDS** com imunodepressão)

avançada) ou outros fatores que possam interferir na resposta à vacina contra a influenza, depois de contato com quem tem infecção.

- **PROFISSIONAIS DE LABORATÓRIO CLÍNICO**, não vacinados ou vacinados há menos de 15 dias, que tenham manipulado amostras clínicas de origem respiratória que contenham o vírus influenza sem uso adequado de equipamento de proteção individual (EPI). O USO DE EPI É OBRIGATÓRIO.
- **TRABALHADORES DE SAÚDE, NÃO VACINADOS OU VACINADOS HÁ MENOS DE 15 DIAS**, e que estiveram ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INVASIVOS GERADORES DE AEROSSÓIS OU NA MANIPULAÇÃO DE SECREÇÕES DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE INFLUENZA SEM O USO ADEQUADO DE EPI.
- **RESIDENTES DE ALTO RISCO EM INSTITUIÇÕES** fechadas e hospitais de longa permanência, durante surtos na instituição (asilos, orfanatos, presídios, hospitais psiquiátricos).

POSOLOGIA DA QUIMIOPROFILAXIA: USO DO OSELTAMIVIR

- ✓ É recomendável que se inicie a profilaxia em até 48 horas após a exposição.
- ✓ A posologia para quimioprofilaxia é de até 10 dias, com uma dose diária.
- ✓ Somente em caso de SURTO, em instituições fechadas, é recomendada a quimioprofilaxia por no mínimo duas semanas a até pelo menos sete dias após a identificação do último caso.

QUIMIOPROFILAXIA

Tabela 2. Quimioprofilaxia - Posologia e administração

Fármaco	Faixa etária	Quimioprofilaxia	
Oseltamivir	Adulto	75 mg/dia, VO por 10 dias	
	Criança maior de 1 ano de idade	≤15 kg	30 mg/dia, VO por 10 dias
		>15 kg a 23 kg	45 mg/dia, VO por 10 dias
		> 23 kg a 40 kg	60 mg/dia, VO por 10 dias
		> 40kg	75 mg/dia, VO por 10 dias
	Criança menor de 1 ano de idade	0 a 8 meses	3 mg/kg ao dia, 10 dias
9 a 11 meses		3,5 mg/kg ao dia, 10 dias	

Fonte: Ministério da Saúde¹, adaptado de GSK/Roche e CDC.

OBS.: **criança <3 meses** – não é recomendado a menos que a situação seja julgada crítica.



REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Influenza CID 10: J11. In: Guia de Vigilância em Saúde: volume 1. 1. ed. atual. Brasília: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia e Serviços; 2017. p.11-34. Disponível em: http://www.hc.ufu.br/sites/default/files/tmp/volume_1_guia_de_vigilancia_em_saude_2017
2. Ministério da Saúde. Informações sobre gripe. Nota Informativa e Recomendações sobre a sazonalidade da influenza 2017. Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/assessoria-de-imprensa/918-saude-de-a-a-z/influenza/22873-informacoes-sobre-gripe>