

Febre do Oropouche

A anatomia de um inseto



www.saude.ce.gov.br

 /saudeceara



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

O inseto transmissor

A febre do Oropouche (FO) é causada por um vírus transmitido pelo **Culicoides paraensis**, conhecido como **maruim**.

Já a dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são transmitidas pelo **Aedes aegypti**.



Como são?

Maruim: tem coloração marrom e é muito pequeno, de 1,5 a 3 mm, sendo chamado de polvinha.

Maruim



Aedes aegypti: tem cor preta, com listras brancas no corpo, cabeça e pernas. Tem de 5 a 7 mm de tamanho, asas translúcidas e voo quase silencioso.

Aedes aegypti



Onde vivem e se reproduzem?

Maruim: prefere áreas rurais e silvestres, úmidas com vegetação, matéria orgânica e água corrente – comuns em vales e encostas.



Aedes aegypti: se adapta em ambientes urbanos e não resiste ao frio de regiões mais altas.



Como se alimentam?

Machos de Aedes e maruim se alimentam de seiva de plantas (açúcares e carboidratos);

Fêmeas precisam de sangue para amadurecer os ovos.

A diferença é que o Aedes põe seus ovos na água enquanto o maruim se desenvolve em matéria orgânica.



Sintomas



febre



dor de cabeça



dor muscular

– sintomas semelhantes aos da dengue, chikungunya e zika.

Atenção:

após melhorar, os sintomas podem voltar entre **7** e **14** dias.



Como se proteger?



Use roupas compridas e sapatos fechados



Aplique repelente nas áreas expostas, especialmente se estiver grávida



Instale telas e mosquiteiros com trama inferior a 1,5mm.



Curta



Comente



Salve



Compartilhe



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

www.saude.ce.gov.br

 /saudeceara