
HEPATITES VIRAIS Como saber se você precisa fazer o teste?







Você já esteve exposto a alguma dessas situações?

- ☐ Teve mais de duas parcerias sexuais em 1 ano.
- ☐ Usa piercing ou tem tatuagem.
- □ Utiliza (ou já utilizou) drogas injetáveis e inaláveis.
- Utiliza (ou já utilizou) anabolizantes ou outros produtos injetáveis para a atividade física.
- □ Realizou transfusão de sangue antes de 1993.
- ☐ Fez cirurgia de grande porte antes de 1993 (inclusive cesárea).

Se você tem mais de 40 anos e já se expôs em uma ou mais situações, você tem indicação para realizar exames para hepatites virais.



O teste rápido é uma forma simples e acessível para diagnosticar a doença.

Ele é feito por meio de um furo na polpa do dedo para a coleta de gota de sangue, com resultado em 20 minutos, e é feito gratuitamente pelo SUS.



Sua vacinação contra as hepatites virais está em dia?

As vacinas contra as hepatites do tipo A e B são consideradas as medidas mais eficazes para evitar casos graves e mortes pela doença. Depois de imunizado, você está protegido por toda a vida.



Quem deve se vacinar contra a hepatite do tipo A?

Crianças de 15 meses a 5 anos incompletos (4 anos, 11 meses e 29 dias).



Quem deve se vacinar contra a hepatite do tipo B?

- Recém-nascidos nas primeiras 24 horas de vida ou na primeira visita no centro de saúde em até 30 dias (esquema vacinal com 3 doses);
- Pessoas com mais de 5 anos que ainda não se vacinaram (esquema vacinal com 3 doses).



É importante respeitar um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas. Procure uma unidade básica de saúde e leve o seu cartão de vacinação.

As vacinas contra as hepatites A e B também são disponibilizadas gratuitamente pelo SUS.

