

Calendário de Vacinação | 2023

VACINAS RECOMENDADAS PARA CRIANÇAS

IDADE	VACINA	DOSE
Ao nascer	BCG-ID Previne as formas graves de tuberculose (miliar e meníngea)	Dose única
	Hepatite B	1ª dose
2 meses	Pentavalente (DTP+Hib+Hep.B) Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções por Hib)	1ª dose
	Poliomielite Inativada (VIP) Previne a paralisia infantil	
	Pneumocócica 10-valente (conjugada) Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo	
	Oral contra Rotavírus Humano (VORH) Previne diarreia por rotavírus	
3 meses	Meningocócica C Previne meningite e meningococcemia (infecção generalizada)	1ª dose



Calendário de Vacinação | 2023

VACINAS RECOMENDADAS PARA CRIANÇAS

IDADE	VACINA	DOSE
4 meses	Pentavalente (DTP+Hib+Hep.B) Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções por Hib)	2ª dose
	Poliomielite Inativada (VIP) Previne a paralisia infantil	
	Pneumocócica 10-valente (conjugada) Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo	
	Oral contra Rotavírus Humano (VORH) Previne diarreia por rotavírus	
5 meses	Meningocócica C Previne meningite e meningococcemia (infecção generalizada)	2ª dose
6 meses	Pentavalente (DTP+Hib+Hep.B) Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções por Hib)	3ª dose
	Poliomielite Inativada (VIP) Previne a paralisia infantil	



Calendário de Vacinação | 2023

VACINAS RECOMENDADAS PARA CRIANÇAS

IDADE	VACINA	DOSE
9 meses	Febre Amarela (atenuada)	Dose única
12 meses	Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola	1ª dose
	Meningocócica C Previne meningite e meningococemia (infecção generalizada)	Reforço
	Pneumocócica 10-valente Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo	Reforço
15 meses	Tríplice Bacteriana (DTP) Previne difteria, tétano e coqueluche	1º reforço
	Poliomielite Oral (VOP) Previne a paralisia infantil	1º reforço
	Hepatite A	Dose única
	Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola	2ª dose
	Varicela	1ª dose
4 anos	Tríplice Bacteriana (DTP) Previne difteria, tétano e coqueluche	2º reforço
	Poliomielite Oral (VOP) Previne a paralisia infantil	2º reforço
	Varicela	2ª dose
	Febre Amarela (atenuada)	Reforço



Calendário de Vacinação | 2023

VACINAS RECOMENDADAS PARA ADOLESCENTES

IDADE	VACINA	DOSE
9 a 14 anos	Papilomavírus Humano (HPV) Previne o papiloma, vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais. Pode ser aplicada até 14 anos, 11 meses e 29 dias.	2 doses (0 e 6 meses)
11 e 12 anos	Meningocócica ACWY Previne a doença meningocócica causada pela bactéria dos sorogrupos A, C, W, Y.	Dose única
11 a 19 anos	Hepatite B (recombinante)	3 doses
	Dupla Bacteriana adulto (dT) Previne difteria e tétano	3 doses e um reforço a cada 10 anos
	Febre Amarela (atenuada)	Dose única
	Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola	2 doses



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Calendário de Vacinação | 2023

VACINAS RECOMENDADAS PARA ADULTOS E IDOSOS

IDADE	VACINA	DOSE
20 a 29 anos	Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola	2 doses
30 a 59 anos	Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola	Dose única
20 a 59 anos	Hepatite B (recombinante)	3 doses
	Dupla Bacteriana adulto (dT) Previne difteria e tétano	3 doses e um reforço a cada 10 anos
	Febre Amarela (atenuada)	Dose única
60 anos e mais	Hepatite B (recombinante)	3 doses
	Influenza (fracionada, inativada) Previne o vírus que causa da gripe	Dose anual
	Dupla Bacteriana adulto (dT) Previne difteria e tétano	3 doses e um reforço a cada 10 anos



Calendário de Vacinação | 2023

VACINAS RECOMENDADAS PARA GESTANTES

VACINA	DOSE
Hepatite B (recombinante)	3 doses
Dupla Bacteriana adulto (dT) Previne difteria e tétano	2 doses
Tríplice Bacteriana Acelular (dTpa) Previne difteria, tétano e coqueluche acelular	Uma dose a cada gestação (a partir da 20ª semana gestacional)
Influenza (fracionada, inativada) Previne o vírus que causa da gripe	Dose anual

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Para cada vacina, deve-se avaliar a caderneta/cartão de vacinação apresentada no momento (data da última dose de vacina registrada e número de doses recebidas anteriormente) e a idade do indivíduo, identificando a necessidade de iniciar/completar o esquema de vacinação ou realizar os reforços. Portanto, não precisa reiniciar o esquema de vacinação caso o adulto, por exemplo, apresente, no ato da vacinação, o registro de doses recebidas em qualquer idade e ciclo de vida (infância e adolescência).



Calendário de Vacinação | 2023

VACINAS RECOMENDADAS TEMPORARIAMENTE

IDADE	VACINA	DOSE
6 a 11 meses	Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola	Uma dose (dose zero), conforme cenário epidemiológico
5 a 10 anos	Meningocócica C Previne meningite e meningococemia (infecção generalizada)	Dose única (até fevereiro de 2023)
Trabalhadores da Saúde, da Educação e do Transporte Coletivo		
13 a 17 anos	Meningocócica ACWY Previne a doença meningocócica causada pela bactéria dos sorogrupos A, C, W, Y.	Dose única (até junho de 2023)



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Calendário de Vacinação | 2023

VACINAS COVID-19

IDADE	DOSE
6 meses a 2 anos	3 doses
3 a 4 anos	2 ou 3 doses + reforço, a depender do laboratório
5 a 11 anos	2 doses + reforço
12 a 17 anos	2 doses + reforço
12 e mais (imunocomprometidos)	2 doses + dose adicional + reforço
18 a 39 anos	2 doses + reforço
40 anos e mais	2 doses + 2 reforços

Nota: O Calendário de Vacinação 2023 é passível de ajustes, conforme recomendações do Ministério da Saúde, que define as normas do Programa Nacional de Imunização.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE



Calendário de Vacinação | 2023

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO 2023 CONTRA A COVID-19 REFORÇO COM A VACINA BIVALENTE - 1ª ETAPA

FASES	GRUPOS PRIORITÁRIOS
Fase 1	<ul style="list-style-type: none">✎ Pessoas de 70 anos e mais;✎ Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (\geq 12 anos de idade), abrigados e os trabalhadores dessas instituições;✎ Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade;✎ Comunidades indígenas;✎ Comunidades ribeirinhas;✎ Comunidades quilombolas.
Fase 2	Pessoas de 60 a 69 anos
Fase 3	Gestantes e puérperas
Fase 4	Profissionais de saúde
Fase 5	Pessoas com deficiência permanente

Fonte: Secretaria da Saúde do Ceará. Disponível em:

https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2022/05/NT_Pfizer_covid_atualizada06022023.pdf






















CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Calendário de Vacinação | 2023

ANEXO 1

ESQUEMA VACINAL DE DOSES MONOVALENTES - POR GRUPO ETÁRIOO

Para quem iniciou o esquema com AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer

DOSE	40 ANOS +	18 A 39 ANOS	12 A 17 ANOS	5 A 11 ANOS	3 A 4 ANOS**	6 MESES A 4 ANOS***
1ª dose						
2ª dose						
1º reforço						
2º reforço						

Intervalo de 8 semanas* (between 1ª dose and 2ª dose)

Intervalo de 4 meses (between 2ª dose and 1º reforço)

Intervalo de 4 meses (between 1º reforço and 2º reforço)

Intervalo de 4 semanas (between 1ª dose and 2ª dose for 6 MESES A 4 ANOS***)

Intervalo de 8 semanas (between 2ª dose and 3ª dose for 6 MESES A 4 ANOS***)

OBSERVAÇÕES:

*Intervalo de 4 semanas para CoronaVac

3 a 4 anos, 11 meses e 29 dias: **esquema primário, definido com **duas** doses monovalentes (1ª dose + 2ª dose) CoronaVac

***6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias: **esquema primário**, definido com **três** doses monovalentes (1ª dose + 2ª dose + 3ª dose) Pfizer (frasco tampa vinho)

Gestantes: Vacinar com Pfizer. Caso não disponível, utilizar CoronaVac. Não é recomendado o uso de vacinas de vetor viral.

VACINAS RECOMENDADAS PARA DOSES DE REFORÇO:

3 anos a 4 anos, 11 meses e 29 dias: Vacinar com Pfizer. Caso não disponível, utilizar CoronaVac.

5 a 17 anos: Vacinar com Pfizer. Caso não disponível, utilizar CoronaVac.

18 a 39 anos: Vacinar, preferencialmente, com Pfizer. Caso não disponível, poderá ser realizado com a vacina disponível no momento (AstraZeneca ou Janssen).

40 a 59 anos: Vacinar, preferencialmente, com Pfizer. Caso não disponível, poderá ser realizado com a vacina disponível no momento (AstraZeneca ou Janssen).










CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Calendário de Vacinação | 2023

ANEXO 1 (continuação)

ESQUEMA VACINAL DE DOSES MONOVALENTES - POR GRUPO ETÁRIO

Para quem iniciou o esquema com **Janssen**

	DOSE	40 ANOS +	18 A 39 ANOS
Intervalo de 2 meses	1ª dose		
Intervalo de 4 meses	2ª dose		
Intervalo de 4 meses	1º reforço		
	2º reforço		

OBSERVAÇÕES:

Esquema primário: definido com **duas** doses monovalentes (1ª dose + 2ª dose)

VACINAS RECOMENDADAS PARA DOSES DE REFORÇO:

Gestantes: Imunizante **NÃO** recomendado para esse grupo.

18 a 39 anos: Vacinar, preferencialmente, com Pfizer. Caso não disponível, poderá ser realizado com a vacina disponível no momento (AstraZeneca ou Janssen).

40 a 59 anos: Vacinar, preferencialmente, com Pfizer. Caso não disponível, poderá ser realizado com a vacina disponível no momento (AstraZeneca ou Janssen).












Calendário de Vacinação | 2023

ANEXO 2

ESQUEMA VACINAL DE DOSES - PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS APTOS A RECEBER O REFORÇO PFIZER BIVALENTE

Para quem iniciou o esquema com AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer, Janssen

	DOSE	12 A 17 ANOS	18 A 39 ANOS	40 ANOS +
Intervalo de 8 semanas*	1ª dose			
	2ª dose			
Intervalo de 4 meses	Reforço (booster)			

OBSERVAÇÕES:

*Intervalo de 4 semanas para CoronaVac

Esquema primário: definido com duas doses monovalentes (1ª dose + 2ª dose)

Grupos prioritários:

- Pessoas de 70 anos e mais;
- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos (abrigados e trabalhadores);
- Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade;
- Indígenas;
- Ribeirinhos;
- Quilombolas;
- Pessoas de 60 a 69 anos;
- Gestantes e puérperas;
- Trabalhadores de saúde;
- Pessoas com deficiência permanente.

Esquema de vacinação prévio monovalente	Recomendação para doses de reforço bivalente
Se 0 ou 1 dose	Pessoas não vacinadas ou que receberam apenas uma dose da vacina devem iniciar ou completar o esquema primário com duas doses de vacina monovalente. Após completar o esquema primário, a dose de reforço bivalente Pfizer poderá ser administrada com intervalo de 4 meses da última dose do esquema primário.
Se 2 doses	Pessoas que completaram o esquema primário ou que já receberam uma ou duas doses de reforço estão aptas a receber a dose de reforço bivalente Pfizer, respeitando o intervalo de 4 meses da última dose recebida.
Se 3 doses	
Se 4 doses	